

# Manejo de conducta en pacientes dentales pediátricos: Artículos esenciales y recomendaciones

**Al Zoubi L, Schmoeckel J, Mustafa Ali M, Alkilzy M, Splieth CH.** Parental acceptance of advanced behaviour management techniques in normal treatment and in emergency situations used in paediatric dentistry. *Eur Arch Paediatr Dent* 2019;20:319-23.

**American Academy of Pediatric Dentistry.** Best practices: Behavior guidance for the pediatric dental patient. 2015. Available at: <https://www.aapd.org/research/oral-health-policies--recommendations/behavior-guidance-for-the-pediatric-dental-patient/>. Accessed Feb. 23, 2020.

**Davies C, Harrison M, Roberts G.** UK national clinical guidelines in paediatric dentistry: guideline for the use of general anaesthesia (GA) in paediatric dentistry. Available at: [https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C21&q=Davies+C%2C+Harrison+M%2C+Roberts+G&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C21&q=Davies+C%2C+Harrison+M%2C+Roberts+G&btnG=). Accessed May 10, 2020.

**Hallonsten AL, Jensen B, Raadal M, Veerkamp J, et al.** EAPD guidelines on sedation in paediatric dentistry 2005. Available at: <https://www.eapd.eu/index.php/policies-and-guidelines>. Accessed April 18, 2020.

**Riba H, Al-Zahrani S, Al-Buqmi N, Al-Jundi A.** A review of behavior evaluation scales in pediatric dentistry and suggested modification to the Frankl Scale. *EC Dental Science* 2017;16;269-75.

**Prado IM, Carcavalli L, Abreu LG, et al.** Use of distraction techniques for the management of anxiety and fear in paediatric dental practice: A systematic review of randomized controlled trials. *Int J Paediatr Dent* 2019;29:650-68.

**Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme (SDCEP).** Conscious sedation in dentistry: Dental clinical guidance, Third Ed., 2012, pp 1-48.

## Antecedentes

En la bibliografía odontológica se han mencionado numerosos métodos de manejo de conducta, entre los que se incluyen: métodos de desensibilización (decir-mostrar-hacer, distracción, uso de la imaginación del niño, humor y uso de eufemismos); refuerzo positivo y elogios; técnicas comunicativas (preguntar-decir-pedir); técnicas aversivas (control de

la voz, mano sobre la boca, estabilización protectora); y técnicas farmacológicas (por ejemplo, inhalación de óxido nitroso-oxígeno, sedación, anestesia general). Las técnicas de manejo de conducta tendrán una aceptación diferente según los países, los grupos de pacientes y los dentistas.

# Recomendaciones de la IAPD

**1.** A la hora de elegir las técnicas de manejo de conducta, hay que tener en cuenta el historial médico, dental y social y el nivel cognitivo del paciente.

Declaración basada en el consenso > Acuerdo global del 100%

**2.** Para controlar y documentar el comportamiento o la ansiedad del niño/la niña a lo largo del tiempo, es aconsejable utilizar una escala (por ejemplo, las escalas conductuales de Frankl, Houpt o Venham).

Declaración basada en el consenso > Acuerdo global del 91%

**3.** Puede ser necesario un consentimiento informado adicional para las técnicas de manejo de conducta que puedan considerarse aversivas.

Declaración basada en el consenso > Acuerdo global del 88%

**4.** El manejo de conducta debe ser realizado por proveedores dentales adecuadamente cualificados y siguiendo la normativa de cada país o estado.

Declaración basada en el consenso > Acuerdo global del 88%

**5.** En algunos casos, y si las necesidades odontológicas lo permiten, posponer el tratamiento o los enfoques mínimamente invasivos pueden ser una alternativa al tratamiento inmediato que requiera técnicas aversivas, sedación y/o anestesia general.

Declaración basada en el consenso > Acuerdo global del 92%

**6.** Las técnicas de manejo de la conducta más aceptables para los padres son la decir-mostrar-hacer,

el refuerzo positivo, la distracción y la inhalación de óxido nitroso/oxígeno.

Declaración basada en el consenso > Acuerdo global del 84%

**7.** La estabilización protectora del/la paciente puede estar indicada para un/una paciente que requiere un diagnóstico inmediato/cuidados urgentes; requiere un tratamiento limitado y no puede cooperar; tiene movimientos incontrolados debido a la edad, tiene problemas emocionales o de desarrollo cognitivo; o es necesaria para la seguridad del paciente, el personal, el dentista o los padres.

Declaración basada en el consenso > Acuerdo global del 79%

**8.** Las indicaciones para la sedación o la anestesia general incluyen: pacientes que todavía no tienen edad para colaborar y temerosos para quienes es probable que las técnicas no farmacológicas de manejo de conducta no tengan éxito; pacientes que no pueden cooperar debido a necesidades físicas, médicas o especiales; y pacientes con necesidades de tratamiento dental extensas o tratamiento de traumatismos dentales.

Declaración basada en el consenso > Acuerdo global del 96%