

Comprendere gli indicatori di qualità dell'evidenza e la percentuale di accordo associata alle raccomandazioni IAPD

Qualità dell'evidenza (valutata dal Comitato Scientifico IAPD)

Le dichiarazioni basate sul consenso si basano sull'opinione di esperti del Comitato Scientifico IAPD o su altri documenti di opinioni di esperti, come i documenti delle best practice AAPD.

Le raccomandazioni basate sul consenso si basano su evidenze pubblicate, di alta qualità, come studi clinici o meta-analisi di studi clinici.

Le raccomandazioni basate sull'evidenza si basano su linee guida di pratica clinica pubblicate, che rappresentano il livello massimo di evidenza, in base a una revisione sistematica o all'analisi di revisioni sistematiche per rispondere a domande predeterminate. Le linee guida di pratica clinica valutano anche il livello di certezza dell'evidenza, valori/preferenze del paziente, l'allocazione delle risorse e l'accettabilità/fattibilità di un intervento.

Accordo percentuale globale

Ciascuna raccomandazione o dichiarazione basata sul consenso IAPD è stata valutata per determinare l'applicabilità alle pratiche cliniche globali. Settantanove membri della IAPD, distribuiti a livello internazionale, hanno esaminato le linee guida e valutato le raccomandazioni utilizzando la scala Likert a 9 punti, con le risposte che vanno da fortemente d'accordo a fortemente in disaccordo. Il numero medio di valutatori per ogni raccomandazione è stato di 23 persone. L'accordo percentuale (moderatamente/molto/fortemente d'accordo) riflette la concordanza tra la dichiarazione/raccomandazione basata sul consenso e le attuali pratiche globali. Le raccomandazioni IAPD che dopo una nuova valutazione non hanno raggiunto un accordo percentuale pari o superiore a 70 sono state considerate prive di accordo globale e sono state eliminate. Le raccomandazioni IAPD classificate come "raccomandazioni basate sull'evidenza" o "approvazione da parte di altre organizzazioni" non hanno ricevuto un punteggio (Non applicabile, N/A) perché sono già standard di cura basati su revisioni sistematiche.