

# Ghidarea Comportamentului la Pacienții Pediatrici în Stomatologie: Articole de Fond și Recomandări

**Al Zoubi L, Schmoeckel J, Mustafa Ali M, Alkilzy M, Splieth CH.** Parental acceptance of advanced behaviour management techniques in normal treatment and in emergency situations used in paediatric dentistry. *Eur Arch Paediatr Dent* 2019;20:319-23.

**American Academy of Pediatric Dentistry.** Best practices: Behavior guidance for the pediatric dental patient. 2015. Available at: <https://www.aapd.org/research/oral-health-policies--recommendations/behavior-guidance-for-the-pediatric-dental-patient/>. Accessed Feb. 23, 2020.

**Davies C, Harrison M, Roberts G.** UK national clinical guidelines in paediatric dentistry: guideline for the use of general anaesthesia (GA) in paediatric dentistry. Available at: [https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C21&q=Davies+C%2C+Harrison+M%2C+Roberts+G&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C21&q=Davies+C%2C+Harrison+M%2C+Roberts+G&btnG=). Accessed May 10, 2020.

**Hallonsten AL, Jensen B, Raadal M, Veerkamp J, et al.** EAPD guidelines on sedation in paediatric dentistry 2005. Available at: <https://www.eapd.eu/index.php/policies-and-guidelines>. Accessed April 18, 2020.

**Riba H, Al-Zahrani S, Al-Buqmi N, Al-Jundi A.** A review of behavior evaluation scales in pediatric dentistry and suggested modification to the Frankl Scale. *EC Dental Science* 2017;16:269-75.

**Prado IM, Carcavalli L, Abreu LG, et al.** Use of distraction techniques for the management of anxiety and fear in paediatric dental practice: A systematic review of randomized controlled trials. *Int J Paediatr Dent* 2019;29:650-68.

**Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme (SDCEP).** Conscious sedation in dentistry: Dental clinical guidance, Third Ed., 2012, pp 1-48.

## Introducere

În literatura stomatologică sunt menționate numeroase metode de ghidare a comportamentului, inclusiv metode de desensibilizare („Tell-Show-Do”/Explică-Arată-Fă, distragerea atenției, utilizarea imaginației copilului, umorul și folosirea eufemismelor); încurajarea și lauda; tehnici de comunicare („Ask-Tell-Ask”/Întreabă-Explică-

Întreabă); tehnici aversive (controlul vocal, metoda „mână-pestă-gură”, stabilizarea protectoare); și tehnici farmacologice (de exemplu inhalarea de protoxid de azot/oxigen, sedarea, anestezia generală). Acceptabilitatea acestor tehnici de ghidare a comportamentului poate varia în funcție de țări, grupuri de pacienți și medici stomatologi.

## Recomandările IAPD

**1.** Atunci când se aleg tehnicile de ghidare a comportamentului, trebuie luate în considerare istoricul medical, dentar și social, precum și nivelul cognitiv al copilului.

Declarație bazată pe consens > Acord global: 100%

**2.** Pentru a monitoriza și documenta comportamentul sau anxietatea copilului în timp, este recomandată utilizarea unei scale (de exemplu, scala de comportament Frankl, Houpt sau Venham).

Declarație bazată pe consens > Acord global: 91%

**3.** Poate fi necesar un consimțământ informat suplimentar pentru tehnicile de management comportamental care ar putea fi considerate aversive.

Declarație bazată pe consens > Acord global: 88%

**4.** Managementul comportamentului trebuie realizat de către furnizori stomatologici calificați, cu respectarea reglementărilor fiecărei țări sau ale fiecărui stat.

Declarație bazată pe consens > Acord global: 88%

**5.** În unele cazuri, dacă necesitățile stomatologice permit, temporizarea tratamentului sau utilizarea unor abordări minim invazive pot fi alternative la tratamentul imediat care ar necesita tehnici aversive, sedare și/sau anestezie generală.

Declarație bazată pe consens > Acord global: 92%

**6.** Pentru părinți, cele mai acceptabile tehnici de management comportamental includ: „tell-show-do” (Explică-Arată-Fă), încurajarea, distragerea atenției și inhalarea de oxid de azot/oxigen.

Declarație bazată pe consens > Acord global: 84%

**7.** Stabilizarea protectoare a pacientului poate fi indicată pentru un pacient care: necesită diagnostic imediat/îngrijire de urgență; necesită tratament limitat și nu poate coopera; are mișcări necontrolate din cauza vârstei, are probleme emoționale sau de dezvoltare cognitivă, sau este necesară pentru siguranța pacientului, a personalului, a medicului stomatolog sau a părintelui.

Declarație bazată pe consens > Acord global: 79%

**8.** Indicațiile pentru sedare sau anestezie generală includ: pacienții precooperanți și speriați pentru care tehnicile non-farmacologice de ghidare comportamentală sunt probabil ineficiente; pacienții care nu pot coopera din cauza nevoilor fizice, medicale sau speciale; și pacienții cu necesități extinse de tratament stomatologic sau care necesită tratament pentru traumatisme dentare.

Declarație bazată pe consens > Acord global: 96%